

**Resumen tabulado de reacciones adversas**

Infecciones e infestaciones	
Muy frecuentes	infección (incluyendo bacteriana, vírica, fúngica, no específica)
Frecuentes	neumonía (incluyendo bacteriana, vírica y fúngica), infecciones/inflamación del tracto respiratorio superior, infección por virus de herpes (incluyendo citomegalovirus - CMV), enterococcosis, sepsis (incluyendo casos poco frecuentes con desenlaces mortales)
No conocida	reactivación del virus de la hepatitis B
Trastornos del sistema linfático	
Muy frecuentes	mielosisupresión (incluyendo anemia, neutropenia, trombocitopenia)
Frecuentes	neutropenia febril
Poco frecuentes	linfadenopatía, linfopenia
Raras	aplasia pura de serie roja
Trastornos del sistema inmunológico	
Poco frecuentes	hipersensibilidad (incluyendo eritema nodoso)
Raras	shock anafiláctico
Trastornos endócrinos	
Poco frecuentes	hipotiroidismo
Raras	hipertiroidismo, tiroiditis
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	
Frecuentes	alteraciones del apetito, hiperuricemia
Poco frecuentes	síndrome de lisis tumoral, deshidratación, hipalbuminemia, hipercolesterolemia
Raras	diabetes mellitus
Trastornos psiquiátricos	
Frecuentes	depresión, insomnio
Poco frecuentes	ansiedad, estado confusional, alteración de la carga emocional, disminución de la libido
Trastornos del sistema nervioso	
Muy frecuentes	cefalea
Frecuentes	neuropatía (incluyendo neuropatía periférica), mareos, disgeusia, somnolencia
Poco frecuentes	hemorragia del SNC ¹ , síncope, temblores, amnesia, alteraciones del equilibrio
Raras	accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, convulsiones, neuritis óptica, parálisis del VII par, demencia, ataxia
Trastornos oculares	
Frecuentes	alteraciones visuales (incluyendo visión distorsionada, visión borrosa, y agudeza visual reducida), ojo seco
Poco frecuentes	insuficiencia visual, conjuntivitis, fotofobia, incremento del lagrimeo
Trastornos del oído y del laberinto	
Frecuentes	trinitus
Poco frecuentes	pérdida de audición, vértigo
Trastornos cardíacos	
Frecuentes	insuficiencia cardíaca congestiva/insuficiencia cardíaca ² , derrame pericárdico, arritmias (incluyendo taquicardia), palpitaciones
Poco frecuentes	infarto de miocardio (incluyendo desenlace mortal), QT prolongado en electrocardiograma, pericarditis, arritmia ventricular (incluyendo taquicardia ventricular), angina de pecho, cardiomegalia, electrocardiograma con onda T anormal, incremento de la troponina
Raras	cor pulmonale, miocarditis, síndrome coronario agudo, paro cardíaco, electrocardiograma con prolongación del intervalo PR, enfermedad arterial coronaria, pleuropericarditis
No conocida	fibrilación auricular/flutter auricular
Trastornos vasculares	
Muy frecuentes	hemorragia ³
Frecuentes	hipertensión, rubor
Poco frecuentes	hipotensión, tromboflebitis
Raras	trombosis venosa profunda, embolismo, livedo reticularis
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	
Muy frecuentes	derrame pleural, disnea
Frecuentes	edema pulmonar, hipertensión pulmonar, infiltración pulmonar, neumonitis, tos
Poco frecuentes	hipertensión arterial pulmonar, broncoespasmo, asma
Raras	embolismo pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo
No conocida	enfermedad intersticial pulmonar
Trastornos gastrointestinales	
Muy frecuentes	diarrea, vómitos, náusea, dolor abdominal
Frecuentes	hemorragia gastrointestinal, colitis (incluyendo colitis neutropénica), gastritis, inflamación de la mucosa (incluyendo mucositis/estomatitis), dispepsia, distensión abdominal, estreñimiento, alteraciones de las mucosas orales
Poco frecuentes	pancreatitis (incluyendo pancreatitis aguda), úlcera del tracto gastrointestinal superior, esofagitis, ascitis, fisura anal, disfagia, enfermedad por reflujo gastroesofágico
Raras	gastroenteropatía con pérdida de proteínas, íleo, fistula anal
No conocida	hemorragia gastrointestinal mortal
Trastornos hepatobiliares	
Poco frecuentes	hepatitis, colecistitis, colestasis
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	
Muy frecuentes	erupción cutánea ⁴
Frecuentes	alopecia, dermatitis (incluyendo eczema), prurito, acné, sequedad de piel, urticaria, hiperhidrosis
Poco frecuentes	dermatitis neutrofilica febril aguda, reacción de fotosensibilidad, trastorno de la pigmentación, paroniquia, úlceras en la piel, ampollas en la piel, alteraciones en las uñas, síndrome de eritrosiostesia palmo-plantar, alteraciones del cabello
Raras	vasculitis leucocitoclástica, fibrosis cutánea
Frecuencia no conocida	Síndrome de Stevens-Johnson ⁵
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	
Muy frecuentes	dolor musculoesquelético
Frecuentes	artralgia, mialgia, debilidad muscular, rigidez muscular, espasmo muscular
Poco frecuentes	rabdomiólisis, osteonecrosis, inflamación muscular, tendinitis, artritis
Raras	fusión epifisaria retardada ⁶ , retraso en el crecimiento ⁷
Trastornos renales y urinarios	
Poco frecuentes	insuficiencia renal (incluyendo fallo renal), frecuencia urinaria, proteinuria
No conocida	Síndrome nefrótico
Embarazo, puerperio y alteraciones perinatales	
Raras	aborto
Trastornos del aparato reproductivo y de la mama	
Poco frecuentes	ginecomastia, menstruación irregular
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	
Muy frecuentes	edema periférico ⁸ , fatiga, pirexia, edema facial ⁹
Frecuentes	astenia, dolor, dolor torácico, edema generalizado, escalofríos
Poco frecuentes	malestar, otros edemas superficiales ⁸
Raras	alteraciones de la marcha
Exploraciones complementarias	
Frecuentes	pérdida de peso, aumento de peso
Poco frecuentes	incremento de la creatin-fosfoquinasa en sangre, aumento de la gamma-glutamil transferasa
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos	
Frecuentes	contusión

¹ Incluye disminución del apetito, saciedad temprana, aumento del apetito.² Incluye hemorragia en el sistema nervioso central, hemorragia cerebral, hematoma extradural, hemorragia intracerebral, derrame cerebral, hemorragia subaracnoidea, hematoma subdural y hemorragia subdural.³ Incluye aumento del púlpido mielocítico cerebral, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha, fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomiopatía, cardiomiopatía congestiva, insuficiencia diastólica, descenso de la fracción de eyección y fallo ventricular, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha e hipoquinesia ventricular.⁴ Excluye sangrado gastrointestinal, y sangrado del sistema nervioso central (SNC); estas reacciones adversas se han informado según la clasificación por órganos y sistemas dentro de trastornos gastrointestinales y dentro de trastornos del sistema nervioso respectivamente.⁵ Incluye erupción medicamentosa, eritema, eritema multiforme, eritema, erupción cutánea exfoliativa, eritema generalizado, erupción genital, miliaria, milio, proriasis pustular miliaria, erupción, erupción eritematosa, erupción foliolar, erupción generalizada, erupción macular, erupción maculopapulosa, erupción papulosa, erupción pruriginosa, erupción pustular, erupción vesicular, exfoliación cutánea, irritación de la piel erupción cutánea tóxica, urticaria vesiculosa y erupción vasculítica.⁶ Se han notificado casos individuales de síndrome Stevens-Johnson en la fase de postcomercialización. No se pudo determinar si estas reacciones adversas mucocutáneas fueron directamente relacionadas con Dasatinib o con medicamento concomitante.⁷ Frecuencia notificada como común en estudios pediátricos.⁸ Edema gestacional, edema localizado, edema periférico.⁹ Edema conjuntival, edema ocular, tumefacción ocular, edema palpebral, edema facial, edema labial, edema macular, edema bucal, edema orbital, edema periorbital, tumefacción facial.¹⁰ Sobrecarga líquida, retención de líquidos, edema gastrointestinal, edema generalizado, edema, edema debido a enfermedad cardíaca, derrame perinefrítico, edema posterior a un procedimiento, edema visceral.¹¹ Tumefacción genital, edema en el lugar de la incisión, edema genital, edema peneano, tumefacción peneana, edema escrotal, tumefacción cutánea, tumefacción testicular, tumefacción vulvovaginal.**Población pediátrica**

El perfil de seguridad en pacientes pediátricos fue comparable al perfil de seguridad en adultos. La frecuencia, el tipo y la gravedad de las reacciones adversas en niños se esperaban que fueran las mismas que en adultos. En estudios pediátricos de LMC, la tasa de anomalías de laboratorio fue consistente con el perfil conocido de parámetros de laboratorio en adultos.

Poblaciones especiales

Mientras el perfil de seguridad de Dasatinib en la población de edad avanzada fue similar al de la población joven, los pacientes con 65 años de edad y mayores tienen mayor probabilidad de experimentar las reacciones adversas comúnmente notificadas como fatiga, derrame pleural, disnea, tos, hemorragia en el tracto gastrointestinal inferior y alteraciones del apetito y mayor probabilidad de experimentar reacciones adversas menos frecuentemente notificadas como distensión abdominal, mareos, derrame pericárdico, fallo cardíaco congestivo y disminución de peso, por lo que deben monitorizarse cuidadosamente.

SOBREDOSFICACIÓN

Considerando que Dasatinib se asocia con mielosisupresión grado 3 ó 4, los pacientes que ingieran una dosis mayor de la recomendada deben ser monitorizados cuidadosamente por la aparición de mielosisupresión y ser tratados con la terapia de soporte adecuada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología.

Atención especializada para niños:

Hospital de Niños Dr Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-2247 ó (011) 4962-6666

Atención especializada para adultos:

Hospital Fernández: (011) 4801-5555

Hospital Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C.

PRESENTACIÓN

Rembre 20 mg, 50 mg y 70 mg comprimidos recubiertos, en envases con 30 y 60 comprimidos recubiertos.

Rembre 80 mg, 100 mg y 140 mg comprimidos recubiertos, en envases con 30 comprimidos recubiertos.

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo supervisión médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema actual, no se lo recomienda a otras personas.

Fecha de última revisión: Enero 2019.

000000-R

Especialidad medicinal autorizada por el ministerio de salud. Certificado N°57007.

Elaborado por: Laboratorio LKM S.A.
Lynch 3461/63, Ciudad Autónoma de Bs. As., Argentina.
Director Técnico: Farm. Eduardo Bruzzone.

GBT Grupo
Biotoscana

